Отдел образования администрации городского округа Карпинск

ПРИКАЗ

от 31.12.2014 г. № 217-д

г. Карпинск

О введении в действие инструкции
по профилактике заражения ВИЧ – инфекцией

Во исполнение комплексной программы городского округа Карпинск «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ - инфекции на территории городского округа Карпинск на 2014 - 2016 годы», согласно п. 8.1.2.5. СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ – инфекции», в соответствии п. 5 Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда (утв. постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17.12.2002 г. № 80), в целях предупреждения распространения ВИЧ – инфекции среди работников образовательных учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию по профилактики заражения ВИЧ – инфекцией и ввести в действие с 01.01.2015 г. (приложение 1).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. провести внеплановый инструктаж по профилактики заражения ВИЧ – инфекцией в срок до 20 января 2015 г. с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте;
2.2. включить инструкцию по профилактики заражения ВИЧ – инфекцией в перечень инструкций вводного инструктажа;
2.3. обеспечить проведение планового инструктажа по профилактики заражения ВИЧ – инфекцией с периодичностью 1 раз в полгода.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на специалиста I категории отдела образования Полякову О.И.

Начальник отдела образования
администрации городского округа Карпинск Р.А. Чуркина

Приложение 1 к приказу
от 31.12.2014 г. № 217 - д

Согласовано:
Председатель городского комитета профсоюза работников образования
_____Т. В. Ортлиб

Утверждаю:
Начальник отдела образования Администрации городского округа Карпинск
_____Р.А. Чуркина

Инструкция по профилактике заражения ВИЧ – инфекцией

1. В случае возникновения «аварийной» ситуации (контакт кожных или слизистых покровов с кровью травмированного человека) отправить всех обучающихся и сотрудников, имевших контакт с кровью, к медицинскому работнику для оказания квалифицированной медицинской помощи и проведения профилактических мероприятий.
2. В случае оказания первой помощи пострадавшему соблюдать следующие меры предосторожности:

- использовать резиновые медицинские перчатки при проведении манипуляций по оказанию первой помощи, при которых возможен контакт с чужой кровью;
- максимально сократить время контакта с чужой кровью путем немедленного промывания участка кожного покрова, на котором есть следы крови, проточной водой с мылом;
- использовать для дезинфекции антисептики (например, 2-4%-й раствор хлоргексидина глюконата);
- не выдавливать кровь из ранок;
- не тереть место контакта;
- не использовать сильнодействующие средства, такие как йод, спирт и др.
- своевременно проводить все профилактические мероприятия: чем быстрее, тем они эффективнее (фактор времени).

«Аварийные» ситуации	**Действия**
В случае попадания чужой крови на слизистые оболочки глаз	• Немедленно промыть глаз чистой проточной водой (или физиологическим раствором), используя любую подходящую емкость (бутыль, кувшин, графин и т.п.), следующим образом: посадить пострадавшего, запрокинуть ему голову, осторожно пальцами раздвинуть (оттянуть) веки и аккуратно лить на глаз воду (или физраствор) таким

	образом, чтобы вода (или физраствор) затекали под веки и свободно вытекали наружу. • Не снимать контактные линзы во время промывания, так как они создают защитный барьер. • После того как глаз промыли, контактные линзы необходимо снять и обработать обычным способом; после этого линзы совершенно безопасны для дальнейшего использования. **Категорически запрещено:** промывать глаза с мылом или дезинфицирующим раствором.
В случае попадания чужой крови на слизистые оболочки ротовой полости	• Немедленно выплюнуть попавшую в рот жидкость! • Ротовую полость тщательно прополоскать чистой водой (или физраствором) и снова выплюнуть. Повторить полоскание несколько раз. **Категорически запрещено:** использовать для промывания полости рта мыло или дезинфицирующий раствор
В случае попадания чужой крови на неповрежденную кожу	• Немедленно промыть загрязненный участок кожи большим количеством проточной воды с использованием мыла. • При отсутствии проточной воды обработать загрязненный участок кожи гелем или раствором для мытья рук. • После промывания можно обработать кожу слабыми дезинфицирующими средствами, например 2–4%-м раствором хлоргексидина глюконата. **Категорически запрещено:** • использовать сильнодействующие средства: спирт, отбеливающие жидкости и йод, так как они могут вызвать раздражение кожи. • тереть или скрести место контакта. • накладывать повязку на место контакта
В случае попадания чужой крови на поврежденную кожу (ссадина, царапина, ранка, которые уже имелись ранее)	• Промыть место контакта большим количеством проточной воды с мылом. • При отсутствии проточной воды обработать загрязненный участок кожи гелем или раствором для мытья рук. **Категорически запрещено:** • использовать сильнодействующие средства: спирт, отбеливающие жидкости и йод, так как они могут вызвать раздражение раневой поверхности и ухудшить состояние раны. • сдавливать или тереть поврежденное место. • отсасывать кровь из ранки
В случае повреждения кожных	• Немедленно промыть поврежденное место большим количеством проточной воды с мылом.

покровов колюще-режущими предметами, которые могли содержать на своей поверхности чужую кровь (укол инъекционной иглой, порез предметом со следами чужой крови и т. д.)	• Подержать раневую поверхность под струей проточной воды (несколько минут или пока кровотечение не прекратится), чтобы дать крови свободно вытекать из раны. • В отсутствие проточной воды обработать поврежденное место дезинфицирующим гелем или раствором для мытья рук. • В данном случае может потребоваться консультация врача-инфекциониста для решения вопроса о назначении медикаментозной профилактики ВИЧ. **Категорически запрещено:** • использовать сильнодействующие средства: спирт, отбеливающие жидкости и йод, так как они могут вызвать раздражение раневой поверхности и ухудшить состояние раны. • сдавливать или тереть поврежденное место. • выдавливать или отсасывать кровь из ранки или места прокола иглой. **Помните, что эффективность медикаментозной профилактики сохраняется только в том случае, если она назначена в течение первых 24–72 часов с момента наступления «аварийной» ситуации**
В случае попадания крови на одежду	• Испачканную одежду необходимо снять, кожу под одеждой тщательно промыть проточной водой с мылом и обработать дезинфицирующими средствами для обработки рук (см. выше). • Испачканную одежду замочить в дезинфицирующем растворе (согласно прилагаемой инструкции по применению дезинфицирующих средств), далее стирать обычными моющими средствами, просушить и прогладить. • Если есть необходимость хранения испачканной чужой кровью одежды, ее следует упаковать в плотный полиэтиленовый пакет и тщательно его завязать. **Все манипуляции необходимо проводить в резиновых перчатках. После снятия перчаток руки вымыть проточной водой с мылом**
В случае попадания крови на пол, стены, мебель, окружающие предметы	• Поверхность обработать дезинфицирующим раствором. • Затем промыть поверхность большим количеством воды. • После использования ветошь опустить в емкость с дезинфицирующим раствором. **Все манипуляции необходимо проводить в резиновых перчатках. После снятия перчаток руки вымыть проточной водой с мылом**